



Struttura Complessa: Risorse Umane e Relazioni Sindacali  
Direttore: Patrizia Alberti

Milano, 30.05.2024

Numero di telefono 1: 02 6444.5264  
Fax: 02 6444.2766  
concorsi@ospedaleniguarda.it  
www.ospedaleniguarda.it

Fascicolo ID 5260/2024 – all. 32

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 14.3.2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTI DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"**

<i>Identificazione procedura</i>	<b>Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari.</b>	
<i>Estremi pubblicazione</i>	Indetto con deliberazione n. 297 del 14.03.2024. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 27.03.2024 nonché, sul portale InPA il 28.03.2024.	
<i>Data espletamento</i>	07.05.2024 – 16.05.2024 – 17.05.2024	
<i>Criteri di valutazione dei titoli</i>	Cfr. allegato 1)	
<i>Criteri generali e modalità di valutazione prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. 27.03.2001 n. 220</i>	Scritto	- 1 punto per ogni risposta corretta, - 0 punti per ogni risposta errata od omessa.
	Pratica	- 2 punti per ogni risposta esatta - 0 punti per risposte errate, omesse o multiple
	Orale	- Cfr. allegato 2)
<i>Prova scritta</i>	Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 3 prove scritte, progressivamente numerate con i numeri dall'1 al 3, composte ciascuna da n. 30 quesiti a risposta multipla, progressivamente indicate con i numeri dall'1 al 4. È stata estratta la prova scritta n. 3 e non estratte le prove n. 1 e 2 (cfr. allegato 3).	
<i>Prova pratica</i>	Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 3 prove pratiche, progressivamente numerate con i numeri dall'1 al 3, composte ciascuna da n. 10 quesiti a risposta multipla, progressivamente indicate con i numeri dall'1 al 3. È stata estratta la prova pratica n. 3 e non estratte le prove n. 1 e 2 (cfr. allegato 4).	
<i>Prova orale</i>	Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, la Commissione ha predisposto n. 7 quesiti (cfr. allegato 5)	

Il Direttore  
S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali  
Patrizia Alberti

an ①

### REGOLE VALUTAZIONE TITOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari

#### CARRIERA (max 10,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
101	Presso USL/PA nel profilo cat. superiore (DS)	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
102	Presso USL/PA nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
103	Presso USL/PA in altro profilo in ambito sanitario	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
110	Presso case di cura conv. nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
111	Presso case di cura conv. nel profilo cat. superiore	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
112	Presso case di cura conv. nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	25
113	Presso case di cura conv. in altro profilo in ambito sanitario	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
120	Servizio militare/civile nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
121	Servizio militare/civile in profili diversi da quello a bando	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
130	Contratto di lavoro quale dipendente presso PA finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	100
131	Contratto di lavoro quale dipendente presso case di cura conv. finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	25
135	Servizio quale infermiere prestato all'estero e riconosciuto	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
199	Servizi non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

#### ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
200	Altra laurea in ambito sanitario	0,500	0	EVE	n.	No	No	100
201	Altra laurea di primo livello/triennale in ambito sanitario	0,300	0	EVE	n.	No	No	100
202	Laurea specialistica/magistrale in ambito sanitario	0,200	0	EVE	n.	No	No	100
203	Master/dottorato di ricerca attinente	0,150	0	EVE	n.	No	No	100
204	Master di I Livello in Management o per le funzioni di coordinamento	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
299	Titoli accademici e di studio non valutabili	0,000	0	EVE	n.	No	No	100

#### PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 2,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
300	Pubblicazioni e capitoli di libro, ultimo quinquennio attinenti	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
350	Abstract, poster comunicazioni a congressi, lettere all'editore, casi clinici, ultimo quinquennio attinenti	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

#### CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 15,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

*Handwritten signatures and initials*

## REGOLE VALUTAZIONE TITOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Esperienze lavorative nel profilo o sup. presso Enti pubblici quale libero professionista/co.co.co. ecc.	1,200	12	PRC	mese	Si	No	100
401	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso Enti pubblici quale libero professionista/co.co.co. ecc.	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
402	Esperienze lavorative nel profilo o sup. presso case di cura conv. quale libero professionista/co.co.co. ecc.	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
403	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso case di cura conv. quale libero professionista/co.co.co. ecc.	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
404	Esperienze lavorative nel profilo o sup. presso privati quale dipendente o libero professionista/co.co.co./interinale ecc.	1,000	12	PRC	mesi	Si	Si	25
405	Esperienze lavorative in profili diversi in ambito sanitario presso privati quale dipendente o libero professionista/co.co.co./interinale/ecc.	0,100	12	PRC	mesi	Si	Si	25
406	Frequenza/volontariato/stage attinenti	0,100	12	PRC	mese	Si	No	100
410	Partecipazioni a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,030	0	EVE	n.	Si	No	100
411	Relatore a corsi/congressi/convegni ultimo quinquennio	0,050	0	EVE	n.	Si	No	100
420	Attività di didattica	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
421	Borsa di studio/di ricerca	0,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
430	Attività di tutor	0,050	0	EVE	n.	No	No	100
440	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./ecc. presso PA finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	No	100
441	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./ecc. presso case di cura conv. finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,500	12	PRC	mesi	Si	Si	25
442	Contratto di lavoro quale libero professionista/co.co.co./interinale/ecc. presso privati finalizzato al contenimento della diffusione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	1,300	12	PRC	mesi	Si	Si	25
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	Si	No	100

*Handwritten signature and initials*



OMISSIS

- prova orale:

OMISSIS

La Commissione stabilisce che nel colloquio verranno verificati i seguenti elementi: la conoscenza tecnica degli argomenti, la capacità di sintesi, la capacità espositiva, l'utilizzo di una terminologia corretta nonché l'attinenza dell'esposizione con gli argomenti e la capacità di approfondimento.


OMISSIS

Handwritten signatures and initials, including 'PAE' and 'M'.



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

PROVA NON ESTRATTA

7/05/2024

Alessandro Valtorta Powell Tupero

# ASST Niguarda

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  
a tempo indeterminato e a tempo pieno  
di n. 3 posti di Infermiere -  
Area dei professionisti della salute e dei funzionari**

**PROVA SCRITTA 01**

selexi<sup>®</sup>  
test your future

AV  
ML

A00001

- 1 **La manovra di Heimlich è utile per:**
- A** disostruire le vie aeree occluse da corpi estranei
  - B** diminuire la frequenza cardiaca in caso di tachicardia
  - C** indagare la presenza di un dolore colecistico
  - D** valutare l'afflusso di sangue alla mano ed alle dita ed in particolare la pervietà delle arterie radiale ed ulnare

A00002

- 2 **Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:**
- A** iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione
  - B** ferita superficiale a spessore parziale che interessa l'epidermide
  - C** iperemia della cute intatta che scompare alla digitopressione
  - D** ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma

A00003

- 3 **Che cos'è la scala di Braden?**
- A** Una scala per la rilevazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione
  - B** Una scala per misurare l'orientamento spazio-temporale della persona assistita
  - C** Una scala per misurare il rischio di caduta
  - D** Una scala per la rilevazione del grado di disfagia

A00004

- 4 **La dieta del paziente affetto da insufficienza renale cronica non sottoposto a dialisi deve:**
- A** limitare l'apporto di potassio
  - B** limitare l'apporto di grassi saturi
  - C** aumentare la quota di liquidi
  - D** limitare l'apporto di proteine

A00005

- 5 **Per stranguria si intende:**
- A** emissione di urina dolorosa e intermittente
  - B** urinare molto, circa 2500ml nelle 24 ore
  - C** alzarsi di notte per urinare
  - D** Tutte le altre alternative sono corrette

A00006

- 6 **La Glasgow Coma Scale (GCS) è:**
- A** una scala di valutazione del livello di coscienza attraverso l'analisi di tre parametri: l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria del paziente a stimoli dolorosi e comandi verbali
  - B** una scala di valutazione delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma
  - C** un test di valutazione del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico nella sfera della comunicazione
  - D** una scala di valutazione soggettiva utilizzata nella pratica clinica per quantificare la spasticità muscolare. Tale scala valuta la resistenza muscolare al movimento passivo

PF  
A/ U/

A00007

- 7 **La definizione di emottisi è:**
- A** emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
  - B** emissione di sangue venoso o arterioso dal naso
  - C** presenza di sangue con le feci
  - D** emissione di sangue con il vomito

A00008

- 8 **Per Evidence Based Nursing si intende:**
- A** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili
  - B** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando la loro esperienza clinica in un contesto di risorse disponibili
  - C** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica, in un contesto di risorse disponibili
  - D** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili

A00009

- 9 **Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n.739:**
- A** istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo Profilo Professionale dell'infermiere
  - B** definisce il Codice Deontologico dell'infermiere
  - C** sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria"
  - D** istituisce il Sistema Sanitario Nazionale

A00010

- 10 **Tra gli effetti collaterali della terapia che prevede la somministrazione di ferro, vengono riportati:**
- A** disturbi gastrointestinali
  - B** raucedine
  - C** ipotensione
  - D** ipertensione

A00011

- 11 **Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:**
- A** sul mitto intermedio
  - B** sul mitto terminale
  - C** sul mitto iniziale
  - D** tutte le altre alternative sono corrette

A00012

- 12 **La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
- A** d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
  - B** d.lgs. 230/1995 e s.m.i.
  - C** non sono previste tutele normative per i lavoratori
  - D** d.lgs. 187/2000 e s.m.i.

A00013

13 Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV (Human Immunodeficiency Virus) positivo?

- A Standard
- B Contatto
- C Nessuna
- D Droplets

A00014

14 La tetraplegia è:

- A la paralisi di quattro arti
- B la perdita della funzione dei nervi del braccio
- C la paralisi parziale o completa dei due arti inferiori
- D la paralisi parziale o completa di una metà (destra o sinistra) del corpo

A00015

15 Al termine di un'iniezione l'infermiere deve gettare siringa e ago:

- A negli appositi contenitori senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago
- B solo dopo aver reincappucciato l'ago
- C nei rifiuti speciali solo dopo aver reincappucciato l'ago
- D la siringa nei rifiuti speciali e l'ago reincappucciato nell'apposito contenitore

A00016

16 Qual è la definizione di "near miss" o "evento evitato", nell'ambito del risk management?

- A errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato
- B errore che causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito
- C errore che non causa un evento avverso
- D Nessuna delle altre alternative è corretta

A00017

17 La scala di Morse è uno strumento utilizzato per:

- A la valutazione del rischio di caduta
- B la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- C la valutazione dello stato di coscienza
- D la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

A00018

18 L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- A con acqua e sapone
- B solo con acqua
- C con soluzione disinfettante non a base alcolica
- D con etere



A00019

19

È definito portatore sano:

- A la persona che, pur non essendo malata, può trasmettere la malattia ad altri
- B la persona che, anche se malata, non trasmette la malattia ad altri
- C la persona che, nella fase acuta della malattia, può trasmetterla ad altri
- D nessuna delle altre alternative è corretta

A00020

20

La posizione da far assumere alla persona durante il posizionamento di un sondino naso gastrico è:

- A semi seduta
- B ortostatica
- C seduta
- D supina

A00021

21

Tra questi, è un modello organizzativo dell'assistenza infermieristica:

- A tutte le altre alternative sono corrette
- B piccole equipe
- C case management
- D primary nursing

A00022

22

L'EBPM (eparina a basso peso molecolare) deve essere somministrata attraverso una iniezione:

- A sottocutanea
- B intramuscolare
- C endovenosa
- D intraossea

A00023

23

La sigla TSO significa:

- A Trattamento Sanitario Obbligatorio
- B Trattamento Sanitario Operatorio
- C Trattamento Sanitario Ordinario
- D Trattamento Sanitario Oncologico

A00024

24

La milza è un organo che si trova a livello del quadrante:

- A superiore sinistro
- B superiore destro
- C sovrappubico
- D inferiore destro

A00025

25 Quando si utilizzano i guanti le mani devono essere lavate:

- A prima e dopo averli indossati
- B prima di averli indossati
- C solo quando evidentemente contaminate
- D dopo averli indossati

A00026

26 L'operazione di scarico di una sostanza stupefacente o psicotropa nell'apposito registro deve essere firmata:

- A dall'operatore che esegue la somministrazione
- B dal Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa
- C dal Direttore di Farmacia
- D dai medici dell'Unità Operativa

A00027

27 L'emoglobina glicosilata è un esame diagnostico per:

- A diabete mellito
- B anemia
- C cirrosi epatica
- D infezioni

A00028

28 Col termine melena si indica l'emissione di:

- A feci color pece o catrame
- B feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
- C feci lucide e cremose
- D feci con striature di sangue rosso vivo

A00029


29 Qual è la complicanza a breve termine più grave della disfagia?

- A L'aspirazione polmonare
- B La malnutrizione
- C La disidratazione
- D Il vomito


A00030

30 Il Codice Deontologico degli infermieri:

- A è lo strumento che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente rispettare nell'esercizio della specifica attività professionale infermieristica
- B è un regolamento interno alla professione infermieristica stilato da esperti di diritto sanitario
- C delinea dei percorsi di soluzioni pratiche ai problemi, definendo in modo vincolante doveri e comportamenti dell'infermiere
- D ha valore anche per gli operatori di supporto che collaborano con gli infermieri



~~10~~ 2 / NI ~~10~~



PROVA NON ESTRATTA

7/05/2024

Alessandro Valtieri

# ASST Niguarda

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  
a tempo indeterminato e a tempo pieno  
di n. 3 posti di Infermiere -  
Area dei professionisti della salute e dei funzionari**

**PROVA SCRITTA 02**

EW PF ML  
selexi  
test your future

B00001

1 **Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?**

- A Il lavaggio delle mani
- B La dotazione di disinfettanti e antibiotici
- C L'utilizzo di flussi d'aria laminari
- D Il ricambio della biancheria da letto

B00002

2 **Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:**

- A iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione
- B ferita superficiale a spessore parziale che interessa l'epidermide
- C iperemia della cute intatta che scompare alla digitopressione
- D ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma

B00003

3 **Che cos'è la scala di Braden?**

- A Una scala per la rilevazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- B Una scala per misurare l'orientamento spazio-temporale della persona assistita
- C Una scala per misurare il rischio di caduta
- D Una scala per la rilevazione del grado di disfagia

B00004

4 **La dieta del paziente affetto da insufficienza renale cronica non sottoposto a dialisi deve:**

- A limitare l'apporto di potassio
- B limitare l'apporto di grassi saturi
- C aumentare la quota di liquidi
- D limitare l'apporto di proteine

B00005

5 **Prima di essere sottoposto a paracentesi, è necessario che il paziente:**

- A svuoti la vescica
- B beva molta acqua e trattenga e le urine
- C sia cateterizzato
- D abbia fatto la doccia

B00006

6 **Per stranguria si intende:**

- A emissione di urina dolorosa e intermittente
- B urinare molto, circa 2500ml nelle 24 ore
- C alzarsi di notte per urinare
- D tutte le altre alternative sono corrette

Handwritten marks: a circled 'A', a circled 'B', and the initials 'ML'.

B00007

7

La Glasgow Coma Scale (GCS) è:

- A** una scala di valutazione del livello di coscienza attraverso l'analisi di tre parametri: l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria del paziente a stimoli dolorosi e comandi verbali
- B** una scala di valutazione delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma
- C** un test di valutazione del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico nella sfera della comunicazione
- D** una scala di valutazione soggettiva utilizzata nella pratica clinica per quantificare la spasticità muscolare. Tale scala valuta la resistenza muscolare al movimento passivo

B00008

8

Tra gli effetti collaterali della terapia che prevede la somministrazione di ferro, vengono riportati:

- A** disturbi gastrointestinali
- B** raucedine
- C** ipotensione
- D** ipertensione

B00009

9

Per fistola si intende:

- A** una comunicazione patologica tra due strutture o cavità dell'organismo, o tra esse e l'esterno
- B** una comunicazione patologica tra un organo interno e la cute
- C** una comunicazione patologica tra due organi cavi
- D** una soluzione di continuo della cute o della membrana mucosa

B00010

10

Le feci acoliche sono:

- A** prive di colore
- B** del neonato
- C** di consistenza molle
- D** striate di sangue

B00011

11

La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:


- A** d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- B** d.lgs. 230/1995 e s.m.i.
- C** non sono previste tutele normative per i lavoratori
- D** d.lgs. 187/2000 e s.m.i.

B00012

12

L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- A** con acqua e sapone
- B** solo con acqua
- C** con soluzione disinfettante non a base alcolica
- D** con etere



B00013

13 L'incapacità di deglutire è definita:

- A disfagia
- B dispepsia
- C disartria
- D disuria

B00014

14 La scala di Morse è uno strumento utilizzato per:

- A la valutazione del rischio di caduta
- B la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- C la valutazione dello stato di coscienza
- D la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

B00015

15 L'EBPM (eparina a basso peso molecolare) deve essere somministrata attraverso una iniezione:

- A sottocutanea
- B intramuscolare
- C endovenosa
- D intraossea

B00016

16 La milza è un organo che si trova a livello del quadrante:

- A superiore sinistro
- B superiore destro
- C sovrapubico
- D inferiore destro

B00017

17 Quando si utilizzano i guanti le mani devono essere lavate:

- A prima e dopo averli indossati
- B prima di averli indossati
- C solo quando evidentemente contaminate
- D dopo averli indossati

B00018

18 L'operazione di scarico di una sostanza stupefacente o psicotropa nell'apposito registro deve essere firmata:

- A dall'operatore che esegue la somministrazione
- B dal Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa
- C dal Direttore di Farmacia
- D dai medici dell'Unità Operativa



B00019

19

Si dice che una ferita guarisce per seconda intenzione quando:

- A si verifica la formazione di abbondante tessuto di granulazione, la guarigione è lenta e comporta la formazione di un'estesa cicatrice
- B si tratta di un'abrasione
- C la ferita è agli arti inferiori
- D i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima

B00020

20

La sigla TSO significa:

- A Trattamento Sanitario Obbligatorio
- B Trattamento Sanitario Operatorio
- C Trattamento Sanitario Ordinario
- D Trattamento Sanitario Oncologico

B00021

21

È definito portatore sano:

- A La persona che, pur non essendo malata, può trasmettere la malattia ad altri
- B La persona che, anche se malata, non trasmette la malattia ad altri
- C La persona che, nella fase acuta della malattia, può trasmetterla ad altri
- D nessuna delle altre alternative è corretta

B00022

22

L'emoglobina glicosilata è un esame diagnostico per:

- A diabete mellito
- B anemia
- C cirrosi epatica
- D infezioni

B00023

23

Guanti, schermi facciali e occhiali protettivi sono:

- A dispositivi di protezione individuale
- B dispositivi di protezione del paziente
- C presidi a esclusivo uso ospedaliero
- D tutte le altre alternative sono corrette

B00024

24

La manovra di Heimlich è utile per:

- A disostruire le vie aeree occluse da corpi estranei
- B diminuire la frequenza cardiaca in caso di tachicardia o calmare un singhiozzo fastidioso
- C indagare la presenza di un dolore colecistico
- D valutare l'afflusso di sangue alla mano ed alle dita ed in particolare la pervietà delle arterie radiale ed ulnare



B00025

25

Cosa si intende per pollachiuria?

- A Minzioni frequenti
- B Minzione involontaria che avviene durante il sonno
- C Minzione dolorosa
- D Mancata emissione di urina all'esterno

B00026

26

Col termine melena si indica l'emissione di:

- A feci color pece o catrame
- B feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
- C feci lucide e cremose
- D feci con striature di sangue rosso vivo

B00027

27

La scialorrea è una condizione caratterizzata da:

- A anomalo ed eccessivo accumulo di saliva nel cavo orale per difficoltà alla deglutizione associata o meno a una aumentata produzione di saliva
- B aumento delle perdite vaginali
- C perdita eccessiva di materiale (da liquido chiaro a muco denso) dal naso
- D ridotta salivazione

B00028

28

L'assistenza infermieristica per il controllo e la riduzione degli edemi prevede anche interventi che portino la persona assistita a:

- A elevare l'arto interessato
- B sostituire nell'alimentazione il sodio con il potassio
- C ridurre l'idratazione
- D privilegiare la posizione seduta rispetto a quella distesa

B00029

29

L'indice di Barthel:

- A Nessuna delle altre alternative è corretta
- B è uno strumento di valutazione dello stato affettivo
- C è uno strumento di valutazione del grado di incontinenza
- D è uno strumento di valutazione della funzione cognitiva


B00030

30

Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?

- A 5 ml
- B 7 ml
- C 3 ml
- D 9 ml

*Handwritten signatures and initials:*  
CV, PF, ML, and a circled symbol.




62

PF

⊕

ML



PROVA ESTRATTA

7/05/2024

Alessandro V. M. Pavesi

# ASST Niguarda

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  
a tempo indeterminato e a tempo pieno  
di n. 3 posti di Infermiere -  
Area dei professionisti della salute e dei funzionari**

**PROVA SCRITTA 03**

selexi<sup>®</sup>  
test your future

av PF ML

C00001

- 1 **La manovra di Heimlich è utile per:**
- A** disostruire le vie aeree occluse da corpi estranei
  - B** diminuire la frequenza cardiaca in caso di tachicardia o calmare un singhiozzo fastidioso
  - C** indagare la presenza di un dolore colecistico
  - D** valutare l'afflusso di sangue alla mano ed alle dita ed in particolare la pervietà delle arterie radiale ed ulnare

C00002

- 2 **Prima di essere sottoposto a Paracentesi, è necessario che il paziente:**
- A** svuoti la vescica
  - B** beva molta acqua e trattenga e le urine
  - C** sia cateterizzato
  - D** abbia fatto la doccia

C00003

- 3 **La Glasgow Coma Scale (GCS) è:**
- A** una scala di valutazione del livello di coscienza attraverso l'analisi di tre parametri: l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria del paziente a stimoli dolorosi e comandi verbali
  - B** una scala di valutazione delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma
  - C** un test di valutazione del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico nella sfera della comunicazione
  - D** una scala di valutazione soggettiva utilizzata nella pratica clinica per quantificare la spasticità muscolare. Tale scala valuta la resistenza muscolare al movimento passivo

C00004

- 4 **Per Evidence Based Nursing si intende:**
- A** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili
  - B** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando la loro esperienza clinica in un contesto di risorse disponibili
  - C** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica, in un contesto di risorse disponibili
  - D** il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili

C00005

- 5 **Tra gli effetti collaterali della terapia che prevede la somministrazione di ferro, vengono riportati:**
- A** disturbi gastrointestinali
  - B** raucedine
  - C** ipotensione
  - D** ipertensione

C00006

- 6 **Le feci acoliche sono:**
- A** prive di colore
  - B** del neonato
  - C** di consistenza molle
  - D** striate di sangue

C00007

7 Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV (Human Immunodeficiency Virus) positivo?

- A Standard
- B Contatto
- C Nessuna
- D Droplets

C00008

8 La tetraplegia è:

- A la paralisi di quattro arti
- B la perdita della funzione dei nervi del braccio
- C la paralisi parziale o completa dei due arti inferiori
- D la paralisi parziale o completa di una metà (destra o sinistra) del corpo

C00009

9 Al termine di un'iniezione l'infermiere deve gettare siringa e ago:

- A negli appositi contenitori senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago
- B solo dopo aver reincappucciato l'ago
- C nei rifiuti speciali solo dopo aver reincappucciato l'ago
- D la siringa nei rifiuti speciali e l'ago reincappucciato nell'apposito contenitore

C00010

10 Quale tra le seguenti non è una complicanza cronica del diabete?

- A Tutte le altre alternative sono complicanze croniche del diabete
- B Retinopatia
- C Chetoacidosi diabetica
- D Neuropatia

C00011

11 Qual è la definizione di "near miss" o "evento evitato" nell'ambito del risk management?

- A Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato
- B Errore che causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito
- C Errore che non causa un evento avverso
- D Nessuna delle altre alternative è corretta

C00012

12 L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- A con acqua e sapone
- B solo con acqua
- C con soluzione disinfettante non a base alcolica
- D con etere

C00013

- 13 Tra questi, è un modello organizzativo dell'assistenza infermieristica:
- A tutti le altre alternative sono corrette
  - B piccole equipe
  - C case management
  - D primary nursing

C00014

- 14 L'EBPM (eparina a basso peso molecolare) deve essere somministrata attraverso una iniezione:
- A sottocutanea
  - B intramuscolare
  - C endovenosa
  - D intraossea

C00015

- 15 La Scala di Braden:
- A è uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione
  - B è uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell'anziano
  - C è uno strumento per il calcolo della dipendenza dell'assistito
  - D è uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati

C00016

- 16 La milza è un organo che si trova a livello del quadrante:
- A superiore sinistro
  - B superiore destro
  - C sovrapubico
  - D inferiore destro

C00017

- 17 Quando si utilizzano i guanti le mani devono essere lavate:
- A prima e dopo averli indossati
  - B prima di averli indossati
  - C solo quando evidentemente contaminate
  - D dopo averli indossati

C00018

- 18 L'operazione di scarico di una sostanza stupefacente o psicotropa nell'apposito registro deve essere firmata:
- A dall'operatore che esegue la somministrazione
  - B dal Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa
  - C dal Direttore di Farmacia
  - D dai medici dell'Unità Operativa

19

**La sigla TSO significa:**

- A** Trattamento Sanitario Obbligatorio
- B** Trattamento Sanitario Operatorio
- C** Trattamento Sanitario Ordinario
- D** Trattamento Sanitario Oncologico

C00020

20

**È definito portatore sano:**

- A** la persona che, pur non essendo malata, può trasmettere la malattia ad altri
- B** la persona che, anche se malata, non trasmette la malattia ad altri
- C** la persona che, nella fase acuta della malattia, può trasmetterla ad altri
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

C00021

21

**L'emoglobina glicosilata è un esame diagnostico per:**

- A** diabete mellito
- B** anemia
- C** cirrosi epatica
- D** infezioni

C00022

22

**Guanti, schermi facciali e occhiali protettivi sono:**

- A** dispositivi di protezione individuale
- B** dispositivi di protezione del paziente
- C** presidi a esclusivo uso ospedaliero
- D** tutte le altre alternative sono corrette

C00023

23

**Cosa si intende per pollachiuria?**

- A** Minzioni frequenti
- B** Minzione involontaria che avviene durante il sonno
- C** Minzione dolorosa
- D** Mancata emissione di urina all'esterno

C00024

24

**Col termine melena si indica l'emissione di:**

- A** feci color pece o catrame
- B** feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
- C** feci lucide e cremose
- D** feci con striature di sangue rosso vivo

C00025

- 25 **La scialorrea è una condizione caratterizzata da:**
- A** anormale ed eccessivo accumulo di saliva nel cavo orale per difficoltà alla deglutizione associata o meno a una aumentata produzione di saliva
  - B** aumento delle perdite vaginali
  - C** perdita eccessiva di materiale (da liquido chiaro a muco denso) dal naso
  - D** ridotta salivazione

C00026

- 26 **L'assistenza infermieristica per il controllo e la riduzione degli edemi prevede anche interventi che portino la persona assistita a:**
- A** elevare l'arto interessato
  - B** sostituire nell'alimentazione il sodio con il potassio
  - C** bere molto poco
  - D** privilegiare la posizione seduta rispetto a quella distesa

C00027

- 27 **Qual è la complicanza a breve termine più grave della disfagia?**
- A** L'aspirazione polmonare
  - B** La malnutrizione
  - C** La disidratazione
  - D** Il vomito

C00028

- 28 **L'indice di Barthel:**
- A** nessuna delle altre alternative è corretta
  - B** è uno strumento di valutazione dello stato affettivo
  - C** è uno strumento di valutazione del grado di incontinenza
  - D** è uno strumento di valutazione della funzione cognitiva


C00029

- 29 **Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?**
- A** 5 ml
  - B** 7 ml
  - C** 3 ml
  - D** 9 ml

C00030

- 30 **La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente si definisce:**
- A** lavaggio
  - B** disinfezione
  - C** decontaminazione
  - D** sterilizzazione






an ①

Sistema Socio Sanitario



Ospedale Niguarda



Regione Lombardia

PROVA NON ESTRATTA

7/05/2024

Alessandro Valtan Pavesi

# ASST Niguarda

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  
a tempo indeterminato e a tempo pieno  
di n. 3 posti di Infermiere -  
Area dei professionisti della salute e dei funzionari**

**PROVA PRATICA 01**

PA  
CA  
selexi  
test your future  
MA

D00001

1 **LESIONI DA PRESSIONE:** Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scompenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.

Che tipologia di superficie è opportuno utilizzare?

- A Materasso antidecubito
- B Letto fluidizzato
- C Materasso standard

D00002

2 **LESIONI DA PRESSIONE:** Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scompenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.

Come è opportuno mantenere l'integrità e idratazione della cute?

- A Praticando l'igiene quotidiana con sapone neutro, acqua tiepida, asciugare tamponando, applicando creme idratanti
- B Frizionando la cute, più volte al giorno
- C Praticare l'igiene a giorni alterni

D00003

3 **LESIONI DA PRESSIONE:** Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scompenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.

In relazione a postura assunta dal paziente e sedi anatomiche maggiormente esposte a pressione e quindi a rischio di lesione da pressione, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A Posizione supina: regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni
- B Posizione laterale: regione trocanterica, regione sacrale, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno del piede, tallone, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare
- C Posizione prona: zigomo, regione temporale, tallone, sacro, padiglione auricolare, arcate costali, spina iliaca anterosuperiore

D00004

4 **LESIONI DA PRESSIONE:** Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scompenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.

Al fine di prevenire il dolore correlato alla lesione da Pressione è consigliato:

- A tutte le altre alternative sono corrette
- B se possibile, non posizionare la persona sull'ulcera da pressione
- C usare un sollevatore o un telo da trasferimento per ridurre al minimo la frizione e/o le forze di stiramento nel posizionamento di un soggetto, mantenendo la biancheria del letto liscia e senza pieghe

D00005

5 **LESIONI DA PRESSIONE:** Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scompenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.

Quale tra le seguenti è una scala per l'individuazione dei pazienti a rischio di Lesioni Da Pressione (LDP):

- A Scala Braden
- B Scala Glasgow
- C Scala Conley

AV PF ~~PF~~ ML

6 **LESIONI DA PRESSIONE: Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scopenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.** D00006

I fattori di rischio per lo sviluppo di lesione da pressione comprendono:

- A tutte le altre alternative sono corrette
- B ridotta mobilità e esposizione a irritanti cutanei (p. es., a causa dell'incontinenza urinaria e/o dell'incontinenza fecale)
- C età > 65 anni e alterata capacità di guarigione delle ferite (p. es., a causa di malnutrizione, diabete, alterata perfusione tissutale dovuta a malattia arteriosa periferica, immobilità, insufficienza venosa)

7 **LESIONI DA PRESSIONE: Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scopenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.** D00007

Cosa deve fare l'infermiere per prevenire l'insorgenza di una lesione da pressione?

- A Nessuna delle altre alternative è corretta
- B Consigliare l'utilizzo di abbigliamento sintetico
- C Frizionare la cute

8 **LESIONI DA PRESSIONE: Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scopenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.** D00008

Nella prevenzione della cute integra è importante:

- A detergere la cute sana con acqua tiepida e detergenti non ionici a pH neutroacido, asciugare tamponando, evitare la frizione, applicare prodotti emollienti
- B eseguire bagno o doccia più volte al giorno con acqua calda e detergenti ionici a pH alcalino
- C dopo il bagno o la doccia è opportuno massaggiare con borotalco o altre polveri per mantenere asciutta la cute

9 **LESIONI DA PRESSIONE: Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scopenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.** D00009

"Cute intatta con eritema non sbiancante alla digitopressione localizzata in corrispondenza di una prominenza ossea" è la definizione di:


- A Lesione da Pressione (LDP) 1 stadio
- B Lesione da Pressione (LDP) 3 stadio
- C Lesione da Pressione (LDP) 4 stadio

10 **LESIONI DA PRESSIONE: Paziente 85 anni, maschio, ricoverato per Scopenso Cardiaco Congestizio, allettato, presenta arrossamento in zona sacrale e ai talloni.** D00010

Per la gestione del dolore procedurale (es durante il cambio della medicazione di una lesione da pressione), è necessario:

- A tutte le altre alternative sono corrette
- B favorire una posizione antalgica per il paziente;
- C effettuare una valutazione completa del dolore

ML  
AV PF ~~EF~~




ML

av AF ~~⊕~~



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

PROVA NON ESTRATTA

7/05/2024

Alessandro Valtzek Pavesi

# ASST Niguarda

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  
a tempo indeterminato e a tempo pieno  
di n. 3 posti di Infermiere -  
Area dei professionisti della salute e dei funzionari**

**PROVA PRATICA 02**

CV PF   
selexi   
test your future

E00001

- 1 **CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

Nell'organizzazione dell'unità posto letto, quali indicazioni da l'infermiere agli operatori di supporto?

- A** Tutte le altre alternative sono corrette
- B** Di allontanare presidi/ausili non necessari
- C** Porre vicino al letto il comodino in modo tale che il paziente abbia un uso più facilitato degli oggetti personali posti sopra

E00002

- 2 **CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

Durante la mobilizzazione/deambulazione, è opportuno presidiare:

- A** la tipologia di calzature e abbigliamento, il corretto utilizzo dell'eventuale ausilio identificato e l'assenza di ostacoli e superfici scivolose
- B** solo la tipologia di calzature e di abbigliamento
- C** solo la presenza di un operatore

E00003

- 3 **CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

Durate l'igiene quotidiana in bagno:

- A** la paziente viene sostenuta/sorvegliata durante le pratiche igieniche, sulla base del livello di autonomia
- B** la paziente viene solo supervisionata da un operatore di supporto
- C** la paziente è lasciata sola per garantire la privacy

E00004

- 4 **CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

Prima dei pasti principali, l'infermiere valuta:

- A** l'opportunità di mobilizzare la paziente perché possa mangiare seduta al tavolo, verificando la necessità di ausili/presidi per mantenere la postura in sicurezza
- B** lascia che l'operatore socio sanitario decida come posizionare il paziente
- C** se chiamare il medico, per aver indicazioni sul posizionamento del paziente per evitare le cadute

E00005

- 5 **CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

Durante il riposo notturno, per evitare cadute accidentali a seguito di un possibile disorientamento spazio-temporale, l'infermiere:

- A** abbassa al minimo l'altezza del letto e incrementa la supervisione, lasciando accesa la luce notturna
- B** contiene la paziente ai quattro arti
- C** alza le spandine del letto e spegne la luce per far riposare meglio la paziente

AV PF ~~PK~~

E00006

6

**CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

**Nonostante gli interventi messi in atto, durante il riposo notturno la paziente si alza autonomamente, senza avvisare il personale infermieristico, e cade a terra mentre si reca in bagno. L'infermiere:**

- A** valuta le condizioni della paziente, i parametri vitali, lo stato di coscienza, rimane con la paziente mentre chiede ai colleghi di allertare il medico
- B** demanda l'azione del ri-allettamento all'operatore socio sanitario, mentre chiama il medico
- C** rimette al letto la paziente senza mettere in atto alcuna valutazione

E00007

7

**CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

**Nel caso in cui la caduta esiti in morte o grave danno al paziente, la caduta è definita:**

- A** un evento sentinella
- B** un near miss o evento evitato
- C** un evento casuale

E00008

8

**CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

**Quale tra le seguenti scale non è adatta alla valutazione del rischio di caduta nei pazienti:**

- A** Scala Braden
- B** Scala Morse
- C** Scala Stratify

E00009

9

**CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

**Quando deve essere valutato il rischio di caduta?**

- A** Tutte le altre alternative sono corrette
- B** A fronte seguito di variazioni del quadro clinico e/o variazioni nella di terapia farmacologica con aggiunta di farmaci che possono aumentare il rischio caduta
- C** All'ammissione del paziente e a intervalli di tempo regolari durante ricoveri prolungati il ricovero e prima del trasferimento ad altra Unità Operativa o struttura e prima della dimissione, se necessario, per facilitare la continuità assistenziale a domicilio

E00010

10


**CADUTE: Paziente 74 anni, ricoverata per esiti di ictus ischemico, parzialmente dipendente dall'assistenza infermieristica, rischio caduta valutato con scala di Morse: medio (25-50).**

**Quali tra i seguenti interventi dovrebbero essere attuati in un paziente con rischio caduta medio?**

- A** Tutte le altre alternative sono corrette
- B** Istruire la persona/caregiver a chiedere assistenza durante i movimenti/trasferimenti (letto/sedia/carrozzina/poltrona)
- C** Prestare attenzione durante lo spostamento del paziente dal letto alla barella, dal letto alla sedia, ecc

EW PF B ML






*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



PROVA ESTRATTA

7/05/2024

Alessandro Valtan *Paolo Botruppo*

# ASST Niguarda

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  
a tempo indeterminato e a tempo pieno  
di n. 3 posti di Infermiere -  
Area dei professionisti della salute e dei funzionari**

**PROVA PRATICA 03**

*FFB av*  
**selexi**  
test your future *ML*

F00001

- 1 **ERRORE DI TERAPIA: Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.**

**Durante la fase di preparazione della terapia, l'infermiere:**

- A** si posiziona in un locale dedicato, pulito, con illuminazione adeguata
- B** si posiziona sul carrello della terapia nel locale consegne per mantenere supervisione del reparto
- C** prepara i farmaci in camera di degenza

F00002

- 2 **ERRORE DI TERAPIA: Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.**

**In caso di prescrizione farmacologica incompleta, l'infermiere:**

- A** avvisa il medico e attende l'aggiornamento della prescrizione, prima di somministrare la terapia
- B** chiede al collega esperto
- C** fa riferimento alla prescrizione farmacologica del giorno prima

F00003

- 3 **ERRORE DI TERAPIA: Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.**

**Durante la preparazione della terapia, più operatori e pazienti interrompono l'attività dell'infermiere:**

- A** risponde alle richieste/necessità solo in casi urgenti, mantenendo alta l'attenzione sulla preparazione dei farmaci
- B** sospende l'attività di preparazione dei farmaci
- C** delega un collega a continuare la preparazione dei farmaci

F00004

- 4 **ERRORE DI TERAPIA: Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.**

**L'infermiere, una volta preparati i farmaci:**

- A** si appresta a somministrare la terapia preparata
- B** chiama il collega del turno e suddivide i compiti
- C** delega l'operatore di supporto a somministrare la terapia orale

F00005

- 5 **ERRORE DI TERAPIA: Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.**

**Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti è consentito:**

- A** penna indelebile e, in caso di errore, si barra con la penna sulla scritta (in modo da consentire la lettura sottostante) e controfirmare e datare al fianco della correzione
- B** penna indelebile e, in caso di errore, si cancella con il bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta
- C** tutte le altre alternative sono corrette

PF ⊕ OV  
ML

F00006

6 **ERRORE DI TERAPIA:** Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.

La tecnica di iniezione "a Z":

- A** è una tecnica per iniezioni intramuscolari
- B** è una tecnica per iniezioni sottocutanee
- C** non esiste

F00007

7 **ERRORE DI TERAPIA:** Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.

L'insulina può essere somministrata attraverso:

- A** via di somministrazione sottocutanea
- B** via di somministrazione intraossea
- C** via di somministrazione rettale

F00008

8 **ERRORE DI TERAPIA:** Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.

Prima di procedere con la somministrazione orale di un farmaco, è necessario:

- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** valutare la presenza di nausea
- C** valutare lo stato di coscienza del paziente

F00009

9 **ERRORE DI TERAPIA:** Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.

Tra gli errori in terapia, sono molto frequenti quelli legati all'uso dei farmaci cosiddetti "Look-Alike/Sound-Alike" ovvero "LASA", acronimo anglosassone utilizzato per indicare i farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome. Per evitare errori in terapia dovuti allo scambio di farmaci LASA, è utile seguire quali delle seguenti raccomandazioni:


- A** tutte le altre alternative sono corrette
- B** evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci. Se ciò fosse necessario, e solo in caso di urgenza, ripetere chiaramente o scandire lettera per lettera, il nome del farmaco o del principio attivo e il dosaggio;
- C** prestare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci e disporre separatamente quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili oppure evidenziarne la somiglianza, utilizzando metodi e strumenti (anche contrassegni supplementari, codici colore, "alerte") purché condivisi tra Farmacia e reparti e diffusi dalla Direzione sanitaria;

F00010

10 **ERRORE DI TERAPIA:** Infermiere si appresta a preparare e somministrare la terapia delle ore 08.00 di un reparto di medicina.

La corretta conservazione delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio (KCl) prevede che:

- A** le fiale di potassio KCl devono essere conservate separatamente da altri farmaci, in armadi ove possibili chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione d'allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
- B** le fiale di potassio KCl devono essere conservate insieme agli altri farmaci
- C** Le fiale di potassio KCl devono essere conservate insieme ad altri farmaci, in armadi chiusi.



*Handwritten marks:*  
A signature or initials on the right side.  
A circled 'A' or similar symbol below the signature.  
A circled 'B' or similar symbol below the circled 'A'.

02.02


16/5/2024

GRUPPO

8:30

ML 62

Assistenza infermieristica alla persona a cui  
è prescritta un'emotrasfusione

  
AF

HLL (3)

16/05/2024

GRUPPO


10:30

HLL  
EU  
PF

# Assistenza infermieristica al paziente con lesioni da pressione

ALL ⑤

16.5.2013 GRUPPO 13.30

Handwritten scribbles and initials, possibly including the letters 'P', 'X', 'cu', and 'HL'.

# Assistenza infermieristica al paziente diabetico con crisi ipoglicemica



ALL 7

16.5.24 GRUPPO  
15.3:

# Assistenza infermieristica al paziente sottoposto a intervento chirurgico


ALL PF EV

Al: (2)

GRUPPO 17.5.2024 ore 9.00

EV (4) M  
PAC


# Assistenza infermieristica al paziente con dolore (nel contesto ospedaliero)

av  ML  
PF

Assistenza infermieristica al paziente  
portatore di stomia (urostomia, colostomia,  
ileostomia)

PL 5

GRUPPO 17.5.2024 ORE 16.00

PF  
aw  M

# Gestione del rischio caduta e scale di valutazione