

S.C. MICROBIOLOGIA CLINICA
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

SCOTCH TEST
RICERCA DI UOVA DI *ENTEROBIUS VERMICULARIS* (OSSIURI)

MATERIALE:



Per l'esecuzione del test sono necessari:

- scotch (nastro adesivo) trasparente (deve essere **rigorosamente del tipo trasparente**)
- **un vetrino portaoggetti.**

È possibile ritirare i vetrini portaoggetti e il porta-vetrini presso il centro prelievi CP (Blocco Nord-Settore F dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, CP Villa Marelli, CP Livigno, CP Ippocrate).

CONSEGNA DEL CAMPIONE

Consegnare al Centro Prelievi preferibilmente entro 2-4 ore dalla raccolta e non oltre le 48 ore dalla raccolta se conservato in frigorifero (4°C).

Aperture Centro Prelievi Niguarda:

- **Blocco Nord, Ospedale Niguarda** (piazza Ospedale Maggiore 3, Milano)
Prelievi: lun-ven 7.30 - 11.00 - Consegna campioni: lun-ven 7.15-14.30
- **Casa di Comunità "Villa Marelli"** (viale Zara 81, Milano)
Prelievi: lun-sab 7.45 - 10.30 - Consegna campioni: lun-ven 7.45-14.30, sabato 7.45-10.30.
- **Poliambulatorio Livigno** (Via Livigno 2, Milano)
Prelievi: lun-ven 7.30-10.00 - Consegna campioni: lun-ven 7.30-10.00
- **Poliambulatorio Ippocrate (Via Ippocrate 45 Milano, Padiglione 4)**
Prelievi: lun-ven 7.30-10.00 - Consegna campioni: lun-ven 7.30-10.00

Per ulteriori informazioni:

- sito web: <https://www.ospedaleniguarda.it/esami-di-laboratorio?qs>
- email: esamilaboratorio@OspedaleNiguarda.it /backofficelaboratorio@ospedaleniguarda.it;
- telefono: back-office laboratorio 02 64443141-4251


Nel caso il campione non risultasse idoneo per l'esecuzione dell'esame, verrete ricontattati per ripetere la raccolta del campione

Per l'esecuzione del test attenersi alle istruzioni riportate nella pagina seguente.

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DELLO SCOTCH TEST

Lo scotch test deve essere eseguito subito dopo il risveglio mattutino, **prima** di effettuare l'igiene personale e della defecazione:

- tagliare un pezzo di nastro adesivo trasparente (5-6 cm), poco più corto del vetrino fornito dal laboratorio
- porre lo scotch su un abbassalingua di legno (o manico di un cucchiaio) con il lato adesivo rivolto verso l'esterno (vedi immagine)
- appoggiare il nastro adesivo sull'orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per 15-20 secondi
- staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino portaoggetti, evitando la formazione di pieghe o di bolle.
- Conservare nel porta-vetrini.



Da “Bench aids for the diagnosis of intestinal parasites”, WHO

N.B. Durante la procedura utilizzare dei guanti monouso e lavarsi bene le mani a prelievo ultimato (le uova sono spesso già infettanti).

Il campione deve essere consegnato ENTRO 2-4 ORE dalla raccolta oppure può essere conservato in frigo per non più di 48 ore.