

LINFOSCINTIGRAFIA	
INDICAZIONI	Ricerca di linfonodo sentinella pre-intervento chirurgico (Melanoma e Ca mammario). Linfedema
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	^{99m} Tc-nanocoll
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Peritumorale subdermica nei tumori del seno palpabili Periareolare nei tumori della mammella non palpabili Pericatrizziale nei tumori precedentemente escissi Interdigitale (mani e piedi) ed acquisizioni planari a 20 e 90 min per il paziente con LINFEDEMA.
MODALITA' ESECUZIONE	Acquisizione a 5 minuti dall'iniezione e monitoraggio continuo della migrazione del radiofarmaco
DURATA COMPLESSIVA	Da 20 minuti a 1 ora e 50'
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	