

DETERMINAZIONE VOLUME PLASMATICO/MASSA ERITROCITARIA	
INDICAZIONI	Poliglobulia, Policitemia
CONTROINDICAZIONI	Salasso effettuato da meno di un mese Gravidanza accertata o presunta Allattamento (occorre interruzione definitiva)
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	DIGIUNO dalla sera precedente
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc-
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Somministrazione per via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	L'indagine prevede l'iniezione di ione stannoso e, 20 minuti dopo, un prelievo di sangue per la marcatura in vitro dei globuli rossi con 99-Tc pertecnetato. Il sangue marcato verrà poi reiniettato. A 20 minuti dalle reiniezione viene effettuato un altro prelievo di sangue
DURATA COMPLESSIVA	Circa 3 ore
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	