



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

## SCINTIGRAFIA CEREBRALE CON DATSCAN

INDICAZIONI	Patologie neurologiche associate a disturbi del movimento (extrapiramidali)
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	Non e' richiesto il digiuno. Ritirare, 2 giorni prima dell'esame presso il servizio di medicina nucleare dalle 14.00 alle 15.00 il farmaco LUGOL 5% in gocce, da assumere per bocca, al domicilio.  Se in trattamento con L-tiroxina (EUTIROX) non è necessario assumere le gocce di LUGOL
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Sospensione di farmaci che possono interferire con il legame Datscan quali anfetamine, sertralina, benzotropine, bupropione.
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	<sup>123</sup> I-IOFLUPANE
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Iniezione del tracciante e dopo 3 ore, acquisizione delle immagini per circa 50 minuti
DURATA COMPLESSIVA	4 ore circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	