

### Scintigrafia con Leucociti marcati

INDICAZIONI	Consente di valutare la presenza di alcuni tipi di infezioni e infiammazioni (in presenza protesi articolari ortopediche e vascolari, raccolte ascessuali e sospetta osteomielite) e nelle malattie infiammatorie addominali (m. di Crohon e rettocolite ulcerosa)
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza e allattamento
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	A digiuno da quattro ore circa prima dell'esame
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Se sta assumendo Antibiotico terapia , va sospesa 15 giorni prima dell'indagine, previo concorde parere dello specialista inviante
EFFETTI COLLATERALI	Nessuno
RADIOFARMACO	99m Tc-HMPAO
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN - EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	E.v
MODALITA' ESECUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si esegue un prelievo di sangue al paziente</li> <li>2. Mediante lavorazione del sangue i leucociti vengono "marcati", con una sostanza detta "radiofarmaco" (o "tracciante radioattivo")</li> <li>3. Il medico reinietta i leucociti marcati al paziente</li> <li>4. I leucociti marcati si accumulano nelle zone del corpo dove c'è un'infezione o un'infiammazione e da qui emettono radiazioni</li> <li>5. La Gamma-camera registra queste radiazioni, che vengono trasformate in immagini; si esegue una TC a bassa dose, per una corretta localizzazione anatomica dei reperti scintigrafici.</li> </ol>
DURATA COMPLESSIVA	Circa 5 ore il primo giorno 1 ora il secondo giorno
PRECAUZIONI POST ESAME	Assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare al paziente il giorno stesso dell'esame	