



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

## SCINTIGRAFIA ghiandole SALIVARI

INDICAZIONI	Valutazione morfofunzionale delle ghiandole salivari maggiori
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	Non e' richiesto il digiuno
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc-pertecnetato
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Iniezione del tracciante e successiva acquisizione delle immagini in rapida sequenza (dinamica) e dopo stimolo acido (limone)
DURATA COMPLESSIVA	1 ora circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	