

**SCINTIGRAFIA OSSEA-ARTICOLARE**

INDICAZIONI	Individuazione di lesioni ossee (secondarie, pagetiche). Sospetta amiloidosi cardiaca
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO. Assumere liquidi durante l'attesa per favorire la rapida eliminazione del radiofarmaco e migliorare il contrasto con l'attività di fondo
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Non segnalati
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc HDP
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Iniezione del radiofarmaco e successive acquisizioni dopo circa 2 h e 30' Durata acquisizione 20 minuti
DURATA COMPLESSIVA	3 ore circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	