



SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSORIA

INDICAZIONI	Ricerca di aree di ridotta perfusione in caso di sospetta embolia polmonare, microembolia. Studio quantitativo in valutazione pre-operatoria
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO E' consigliato rx torace recente (<7 gg)
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Nessuno
RADIOFARMACO	99m Tc-MAA ev
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Somministrazione del tracciante e acquisizione delle immagini
DURATA COMPLESSIVA	1 ora
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	