

**SCINTIGRAFIA RENALE CISMAG**

INDICAZIONI	Patologie del giunto pielo-ureterale e sospetto refusso vescico-ureterale in pazienti PEDIATRICI
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO. Buona idratazione
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc-MAG 3
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Per via endovenosa Il paziente pediatrico si reca prima dell'esame in PEDIATRIA per posizionare l'agocanula e il catetere vescicale. Può essere necessaria la somministrazione di Lasix
MODALITA' ESECUZIONE	Acquisizione di immagini dinamiche in rapida sequenza dopo la somministrazione ev. del tracciante e acquisizione di immagini dinamiche in rapida sequenza dopo la somministrazione attraverso catetere vascolare di tracciante(FASE di riempimento vescicale, seguita da FASE di svuotamento vescicale).
DURATA COMPLESSIVA	1 ora
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare al paziente il giorno stesso dell'esame	