

**SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE**

INDICAZIONI	Feocromocitoma: conferma di sede, multifocalità, eventuali recidive ed identificazione per la possibilità di terapia radiometabolica. Paraganglioma e neuroblastoma: conferma di sede, multifocalità, eventuali recidive ed identificazione per la possibilità di terapia radiometabolica. Apudomi (Carcinoide): conferma di sede, multifocalità, eventuali recidive ed identificazione per la possibilità di terapia radiometabolica. Carcinoma midollare della tiroide: conferma di sede, multifocalità, eventuali recidive ed identificazione per la possibilità di terapia radiometabolica. Men I e Men II: conferma di sede, multifocalità, eventuali recidive ed identificazione per la possibilità di terapia radiometabolica
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta; allattamento (interruzione definitiva)
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	Digiuno da almeno 4 ore; Soluzione di LUGOL 5% dal giorno prima dell'iniezione endovenosa, il giorno stesso della somministrazione e nei 7 giorni (4 gtt, da assumere una volta /die a stomaco pieno): RITIRO delle gocce, 2 giorni prima dell'esame, presso il servizio di Medicina Nucleare. Se in trattamento con L-tiroxina (EUTIROX) non è necessario assumere le gocce di LUGOL
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	La reserpina, gli IMAO, gli anti depressivi Triciclici; possono inibire la captazione surrenalica del tracciante (da sospendere solo previo consenso del CURANTE SPECIALISTA)
EFFETTI COLLATERALI	Nessuno
RADIOFARMACO	Meta-iodobenzil-guanidina -131 MIBG
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Endovena
MODALITA' ESECUZIONE	Valutazione anamnesitica - acquisizioni planari di circa 30 min a 24 e 72 ore dalla somministrazione
DURATA COMPLESSIVA	Il tempo necessario per l'indagine è di circa 30 minuti a 24-72 ore dall'iniezione endovenosa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se non controindicato, assumere almeno 1,5 L di acqua nelle 24 ore successive all'esame per facilitare l'escrezione urinaria del radiotracciante. Nelle giornate dell'esame, evitare contatti ravvicinati (<2 m) e prolungati con donne gravide e bambini.
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	