

**SCINTIGRAFIA RENALE MAG3**

INDICAZIONI	Patologie del giunto pielo-ureterale e in pazienti PEDIATRICI
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO. Buona idratazione con somministrazione di circa 500 ml di acqua 30 minuti prima dell'esame
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc-MAG 3
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Per via endovenosa Il paziente pediatrico si reca prima dell'esame in PEDIATRIA per posizionare l'agocanula e il catetere vescicale. Può essere necessaria la somministrazione di diuretico (Furosemide - Lasix)
MODALITA' ESECUZIONE	Acquisizione di immagini dinamiche in rapida sequenza dopo la somministrazione ev. del tracciante
DURATA COMPLESSIVA	1 ora
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	