

| SCINTIGRAFIA MIOCARDICA RECETTORIALE CON METAIODOBENZILGUANIDINA (MIBG) | |
|---|--|
| INDICAZIONI | Valutazione denervazione dopaminergica cardiaca (m.di Parkison, Lewy Bodies) e scompenso cardiaco cronico |
| CONTROINDICAZIONI | Gravidanza accertata o presunta e allattamento |
| PREPARAZIONE DEL PAZIENTE | <p>NON E' RICHiesto IL DIGIUNO. Ritirare, 2 giorni prima dell'esame presso il Servizio di Medicina Nucleare dalle 14.00 alle 15.00, il farmaco LUGOL 5% in gocce, da assumere per bocca, al domicilio.</p> <p>Se in trattamento con L-tiroxina (EUTIROX) e in caso di asportazione della Tiroide non è necessario assumere le gocce di LUGOL</p> |
| FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME | Oppiacei, cocaina, tramadol, antidepressivi triciclici, simpatico mimentici |
| EFFETTI COLLATERALI | Nessuno |
| RADIOFARMACO | ¹²³ -I MIBG |
| ATTIVITA' SOMMINISTRATA | Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN |
| MODALITA' SOMMINISTRAZIONE | Via endovenosa |
| MODALITA' ESECUZIONE | Esame dinamico: acquisizione a 15 minuti e a 4 ore dalla somministrazione del tracciante |
| DURATA COMPLESSIVA | 4-5 ore |
| PRECAUZIONI POST ESAME | Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini |
| Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame | |