



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

<b>SCINTIGRAFIA PER LA RICERCA DEL DIVERTICOLO DI MECKEL</b>	
INDICAZIONI	Individuare eventuale mucosa gastrica ectopica, in pazienti con sanguinamento, prevalentemente nei pazienti pediatrici
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta; allattamento (sopensione temporanea)
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	Digiuno da almeno 4 ore. Il paziente non deve aver eseguito una colonscopia e/o clisma opaco nelle 48 ore precedenti. Pre-trattamento per uno/due giorni con inibitori della secrezione acida da parte della mucosa gastrica (anti-H2 o inibitori di pompa; (ad es: Cimetidina, Ranitidina, Pentagastrina e Glucagone)
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	<sup>99m</sup> Tc (Tecnezio)
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Somministrazione per via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	La registrazione di immagini per 60 minuti ed una ulteriori immagini tardive, sulla regione addominale, al fine di individuare eventuale mucosa gastrica ectopica. Per aumentare la sensibilità dell'indagine si esegue un pretrattamento con un farmaco in grado di bloccare i recettori H2 dell'istamina e diminuire la peristalsi (ad es: Cimetidina, Ranitidina, Pentagastrina e Glucagone)
DURATA COMPLESSIVA	1h circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se non controindicato, assumere almeno 1,5 L di acqua nelle 24 ore successive all'esame per facilitare l'escrezione urinaria del radiotracciante. Nelle giornate dell'esame, evitare contatti ravvicinati (<2 m) e prolungati con donne gravide e bambini.
	Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare al paziente il giorno stesso dell'esame